

**Stoneham Escuelas
Públicas
Departamento de Servicios
de salud**

Los piojos de la cabeza (PEDICULOSIS) el examen y la evaluación

objetivo

Para contener la infestación de piojos de la cabeza entre la población en edad escolar mientras maximiza el rendimiento académico de los alumnos y minimizar ausencias debidas a una innecesaria exclusión de estudiantes de enfermería y con las mejores prácticas médicas. La Academia Americana de Pediatría y la asociación nacional de enfermeras escolares ya no suscriben un "No liendres" política en las escuelas. La exclusión no es una herramienta eficaz en la reducción de los brotes de piojos (CDC, 2010; Frankowski & Bocchini, 2010; Frankowski & Weiner, 2002). En casos que involucran los piojos de la cabeza, como en todas las cuestiones de salud en la escuela, es vital que la enfermera de la escuela evitar estigmatizar y mantener la privacidad del alumno, así como el derecho de la familia a la confidencialidad (Gordon, 2007).

STANDARD

La enfermera de la escuela podrá examinar la cabeza de cualquier niño sospechoso de padecer una infestación de piojos vivos y notificará a los padres/tutores. Los piojos de la cabeza no son un peligro para la salud o un signo de suciedad y No son responsables de la propagación de la enfermedad (Frankowski & Weiner, 2002). Los piojos positivos no son una emergencia de salud pública. Los piojos no pueden saltar o volar; rastreo. En la mayoría de los casos se produce la transmisión Por el contacto directo con la cabeza de otro individuo (Chunge infestadas, et al. 1991).

Los niños regresan a la escuela después de que el tratamiento para los piojos de la cabeza será examinado por la enfermera de la escuela para verificar la ausencia de los piojos vivos antes de entrar en el aula.

La presencia de liendres no indica infestación activa y no se encuentra evidencia de que la presencia de liendres se correlaciona con cualquier proceso de enfermedad (Scott, Gilmer, Johannessen, 2004). Otros estudios muestran que los piojos no son altamente transferibles en el ámbito escolar (Hootman, 2002) y no hay brotes de piojos dio lugar al permitir que los niños con liendres permanecer en clase (Scott, Gilmer & Johannessen, 2004). Las enfermeras podrán realizar el objetivo pediculosis proyecciones basadas en los afectados conocidos del estudiante

Los contactos estrechos y miembros de la familia. Toda la clase proyecciones para las liendres solos no han demostrado ser eficaces y sólo se llevará a cabo sobre la base de varias infestaciones por piojos vivos encontrados en una sola clase (CDC, 2010; Frankowski & Weiner, 2002).

Procedimiento

Tras la notificación de los casos sospechosos de los piojos de la cabeza, la enfermera de la escuela estudiará el estudiante.

- Una infestación será determinado por mirando atentamente aunque el cabello y el cuero cabelludo para la viabilidad de las liendres o los piojos vivos. Los piojos y las liendres (blanco sucio a huevos de color gris, adheridos al tallo del cabello) son visibles al ojo

desnudo. Las liendres que están a más de $\frac{1}{4}$ de pulgada del cuero cabelludo son consideradas no viables porque los huevos son depositados en el cuero cabelludo y el ciclo de vida es corto, por lo tanto, cualquier resto de nits más allá de $\frac{1}{4}$ de pulgada (el crecimiento del vello lleva más tiempo) están vacías o muertos.

- La enfermera determinará la severidad de la infestación (los piojos vivos o liendres) y el padre/guardián será notificado por teléfono, correo electrónico y/o una nota enviada a casa con el estudiante (véase "Piojos Pantalla Información para Padres"). Sobre la base de la infestación, la enfermera determinará si el niño es tan incómoda que debe ir a casa o si el niño puede permanecer en la escuela. El padre/guardián será proporcionado con información sobre la biología de los piojos de la cabeza, los métodos para eliminar la infestación y direcciones para examinar los contactos domésticos de los piojos y liendres y que el estudiante debe comprobar en primer lugar con la enfermera de la escuela de regreso a la escuela al día siguiente.
- ✓ •si sólo se detectan liendres el estudiante permanecerá en su aula para el resto de la jornada escolar.
- ✓ •La enfermera de la escuela podrá realizar un cribado selectivo de los estudiantes más probabilidades de haber tenido contacto directo de cabeza a cabeza con el estudiante afectado (especialmente los últimos sleepovers). Los padres/tutores serán remitidos a su proveedor de atención en salud para el seguimiento si hay resultados positivos, o los piojos son resistentes al tratamiento. Si 3 estudiantes en una clase están afectados, todos los compañeros serán inspeccionados y en ese momento una clase amplia carta será enviado a casa (Véase "Notas de la Enfermera" Carta de aula).

A los estudiantes regresan a la escuela:

- Examinar cabello del estudiante para la presencia de piojos en el comienzo de la escuela. Es necesario ser estudiante los piojos vivos libres de regresar a la escuela al día siguiente.
- Permite que el alumno para permanecer en la escuela si no hay presencia de los piojos vivos. Un estudiante puede permanecer en la escuela si solo se encuentran liendres.

Información adicional relativa a los piojos de la cabeza:

- Los padres/tutores serán alentadas a verificar el tratamiento tan pronto como sea posible después de la notificación. Se alentará a los padres a que compruebe su cabeza del niño diariamente durante al menos 2-3 semanas después de su descubrimiento. Quitar las liendres cada día durante 3 semanas es el tratamiento más eficaz.
- Los estudiantes serán desalentados de cabeza a cabeza con directo contacto con otros estudiantes. La enfermera de la escuela ofrecerá educación del personal acerca de cómo manejar las liendres y/o piojos vivos en el aula según sea necesario.

- ✓ •El medio más común de transmisión es a través de la directa/físico (cabeza a cabeza) contacto. Transmisión indirecta es poco frecuente pero puede ocurrir desde el uso compartido de peines, cepillos, sombreros y accesorios para el cabello que han estado en contacto con una persona infestada. Las escuelas no son una fuente común de transmisión. Los piojos prefieren el pelo limpio porque es más fácil de acoplar al cabello para poner sus huevos.

••**Personal** □ **mantendrá la privacidad de los estudiantes** identificados como infectados con piojos de la cabeza.

••La enfermera de la escuela □ clave es el profesional de la salud para proporcionar educación y orientación anticipada a la comunidad escolar sobre las mejores prácticas para el manejo de la pediculosis. La enfermera de la escuela las metas sean para facilitar una evaluación exacta del problema, contener la infestación, proporcionar la información sanitaria adecuada para el tratamiento y la prevención, evitar la exposición a productos químicos potencialmente peligrosos y minimizar Ausencia escolar.

Documentos de apoyo dentro de la

política

- Carta de padres con instrucciones para la positiva ("Pantallas PIOJOS Piojos Información Para los Padres").
- Los piojos vivos Nota para el aula de padres (toda la clase)

General y salud pública información acerca de piojos en las escuelas para uso periódicoamente

- El día de la apertura, una carta a los padres acerca de Los Piojos
- Los piojos de la cabeza periódico folleto instructivo en el sitio web ("Piojos-10 pasos para quedarse Ahead")
- Las enfermeras Top 10 Hechos acerca de piojos en el sitio web ("SPS Enfermeras Top 10 Hechos acerca de Los piojos").

Recursos

La Academia Americana de Pediatría. (2010). *Declaración de política: Informe Clínico los piojos de la cabeza*. Recupera de <http://aappolicy.aappublications.org/cgi/content/full/pediatrics;126/2/392>.

La Asociación Americana de Salud Escolar. (2005). *Las políticas escolares en el manejo de la pediculosis*.

Recuperado de: <http://www.ashaweb.org/files/public/resolutions/pediculosis.pdf>.

Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. (2010). *Los piojos de la cabeza información para las escuelas*. Recupera de <http://www.cdc.gov/parasites/lice/head/index/html>.

Chunge, R.N., et al. (1991). Un estudio piloto para investigar la transmisión de los piojos de la cabeza. *Canadian Revista de Salud Pública*, 82, 207-208.

Frankowski, B.L., & Bocchini, J.A. (2010). Comité de Salud Escolar Comité Estadounidense sobre las enfermedades infecciosas, la Academia de Pediatría. Informe clínico: los piojos de la cabeza. *Pediatría*, 126(2), 392-403.

Frankowski, B.L., & Weiner, L.B. (2002). Comité de Salud Escolar Comité de Enfermedades Infecciosas La enfermedad, la Academia Americana de Pediatría. Informe clínico: los piojos de la cabeza. *Pediatría*, 126(2), 392-403.

Gordon, S. (2007). Vulnerabilidad compartida: una teoría del cuidado de los niños con la persistencia de los piojos de la cabeza. *La Revista de la Escuela de Enfermería*. 23 (5), 283-292. doi: 10.1177/10598405070230050701

Hootman, J. (2002). La mejora de la calidad de proyectos relacionados con la gestión de Pediculosis. *Oficial de la Escuela de Enfermería*, 18(2) 80-86.

Massachusetts Departamento De Público Salud. (2007). Pediculosis (Cabeza Los piojos). *El Completo manual de salud escolar*, (8), 56-58.

Asociación nacional de enfermeras escolares. (2011). *Declaración de posición: pediculosis en la escuela* *Ajuste*. Recupera de <http://www.nasn.org/default.aspx?tabid+237>.

Directriz nacional Clearinghouse. (2008). *Directrices para el diagnóstico y el tratamiento de la pediculosis capitis (piojos) en niños y adultos*. Recupera de http://www.guideline.gov/summary/summary.aspx?doc_id+12784&nbr=00658&string=Pediculos.

Pollack, R. (2009). Los piojos de la cabeza. Declaración de la Escuela de Salud Pública de Harvard. Recupera de <http://www.hsph.harvard.edu/headlice.html>.

Pollock, R. J. (2010). *¿Cuántas personas están infestadas con piojos de la cabeza?* Recuperado de: <https://identify.us.com/head-lice/head-lice-FAQS/how-many-people-infested.html>

Pollack R.J., Spielman Kiszewski A.E., A., (2000). Durante el diagnóstico y la consiguiente mala gestión del piojo de la cabeza Infestación en América del Norte. *Pediatric Infectious Disease Journal*. 2000 (8):689-93.

Williams, L.K., et al (2001). Los piojos y liendres, la política escolar. *Pediatría*, 107 (5), 1011-1015.

Revisada en noviembre de 2012

LICE- 10 SPTE A STAY UNACABEZA

Información general HANDOUT desde la enfermera de la escuela

HEADLHIELO (o pediculosis) son poco molestos insectos que viven en el cuero cabelludo y humano. Se alimentan de sangre. Son pequeñas, de color marrón critter (menos de 1/8 de largo). Su depósito minúsculo, Los huevos de color gris/blanco, conocido como "liendres", en el eje de pelo 2 - 4mm desde el cuero cabelludo porque la Los huevos necesitan la calidez del cuero cabelludo para incubarse. No puede vivir más de 48 horas. Lejos del cuero cabelludo como insectos adultos y huevos no eclosionan en temperaturas inferiores a Aquellos que se encuentran cerca del cuero cabelludo. **Los piojos no transmiten enfermedades, pero son una molestia.** No son un Signo de mala higiene o inmundo Casas. *les encanta el cabello limpio*, porque es más fácil de sujetar en ! Los piojos son transmitidos por contacto directo, cara a cara, gatear, no volar o salto. **Una vez descubierto, el niño debe permanecer en casa hasta que sólo han sido tratados.**

Permanecer delante de HEAD PIOJOS:

1. Buscar signos/síntomas de los piojos de la cabeza: exceso de picazón o rascarse la cabeza especialmente Detrás de las orejas y la nuca.
2. Comprobar los miembros de la familia de los piojos y las liendres o huevos al menos una vez a la semana. ayuda a utilizar naturales Luz y una lupa.
3. **Consultar con su médico para obtener asesoramiento.** tratar sólo los miembros de la familia que tiene piojos. más Los medicamentos de venta libre (pediculocidas) que matan los piojos y las liendres son recomendados. La mayoría de Estas sustancias químicas requieren 2 tratamientos de 7 a 10 días.
4. Utilice estos champús especializados **exactamente como se indica** para ser más eficaz utilizar el producto . Sobre Fregadero. Mantener los ojos cubiertos con la toallita.
5. Quitar todas las liendres (huevos) con un peine metálico dentado fino es la forma más eficaz Para deshacerse de ellos. Esto puede ser un trabajo tedioso.
6. Lave infestadas de artículos que pueden ser lavados a 130 F (54.4 C) y seco en el caliente Configuración (sombreros, almohadas, ropa de cama, ropa, etc.).
7. juguetes, artículos personales, ropa de cama y otros tejidos y muebles tapizados que no puede ser Lavados con agua caliente y secadora o limpiar en seco pueden mantenerse alejado de las personas (en un La bolsa de plástico) por más de 2 días si hay preocupación de la infestación.
8. Los piojos de la cabeza pueden vivir durante 1 -2 días lejos del cuero cabelludo en función de la temperatura; Tratamiento químico del medio ambiente no es necesaria. suelos, alfombras, vacío Colchones y muebles.
9. **Continuar para verificar diariamente la cabeza al menos de 2 a 3 semanas después de su descubrimiento. quitar liendres**

Cada día durante 3 semanas es el tratamiento más eficaz.

10. Ayuda a prevenir la infestación de piojos por alentar a su hijo a no participar en una actividad que

Causas contacto cabeza a cabeza. Sabemos que cualquier familia puede coger piojos, y la mayoría de nosotros que

Los padres han pasado por lo menos una vez a nosotros mismos.

Póngase en contacto con su enfermera de la escuela si tiene preguntas:

La escuela pública de Stoneham enfermeras Top 10 Hechos acerca de Los Piojos

Las enfermeras escolares apoyan abogados que le ayudarán a obtener tratamiento piojos y utilizarlo correctamente. Las enfermeras escolares le ayudará a controlar o revisar como se trabaja para eliminar los piojos y liendres desde La cabeza del niño. Sólo tiene que preguntar.

Las enfermeras escolares no juzgará a usted o le informe o informar a otros si pedir ayuda tratar los piojos de la cabeza. Nosotros Los piojos de la manija en un confidencial man Er. Sabemos que cualquier familias pueden detenerlos, y la mayoría de nosotros que son paréntesis sido por lo menos una vez a nosotros mismos.

Las
Ts han

1. Los piojos no son fáciles de conseguir - Los piojos se propagan Principalmente por la cabeza - a - cabeza contacto. Son mucho más difíciles de conseguir que un resfriado, gripe, conjuntivitis, faringitis estreptocócica o impétigo.

2. Los piojos no son a menudo pasan a través de HAT S y cascos - Mientras que esto es Posiblemente e, es raro. Los cepillos, almohadas y sábanas son mucho más comunes los modos de transmisión. Un piojo en un sombrero o una chaqueta es un piojo muere y no es capaz de reproducir.

3. La escuela no es un lugar común para los piojos transmi Sión-La escuela es una rara fuente de transmisión. Mucho más comunes son los miembros de la familia, de la noche a la mañana los invitados y compañeros Que dedicar gran cantidad de tiempo juntos.

4. Una higiene deficiente no contribuye PIOJOS Piojos - como realmente como limpiar el pelo más de piojos de la cabeza no son una fuente de infección o enfermedad; son simplemente una molestia. Sucio. Los

5. Los piojos no pueden saltar o volar de una persona a otra. Los Piojos - sólo puede rastrear.

6. Cualquier liendres en el cabello izquierdo No necesariamente Los piojos causan volver - Cualquier nits farther lejos de un cuarto de pulgada a media pulgada en el cabello ya están nacidas y no suponen ningún riesgo para los demás.

7. Los huevos o liendres no puede caer fuera de la Cabello, berlina, y causar piojos en otra persona - Las liendres se adhieren al cabello y muy difícil de quitar . No pueden caerse. Las larvas recién eclosionadas deberán encontrar un cabezal rápidamente O morirán. Quitar las liendres (huevos) con un peine de dientes finos es hora -Consumir sino el camino más eficaz para deshacerse de ellos. No lave.

8. Los piojos no viven mucho tiempo Fuera de una cabeza humana - Los piojos viven sólo de 1 a 2 días fuera de la cabeza humana están muriendo piojos no es capaz de reproducir . Y si están fuera de la cabeza

9. Todos los miembros de una familia no necesita Ser tratados si una persona tiene piojos - Sólo la persona con piojos deben ser tr eated. Los piojos champús son insecticidas y pueden ser peligrosos si se usan incorrectamente demasiado frecuente. O

10. Comprobación de un classro m cuando un estudiante tiene piojos no Prevenir que los piojos se propaguen - Transmisión del aula es muy rara y un derroche de valiosos El tiempo de enseñanza. Comprobación de familiares y compañeros cercanos es mucho más apropiado.

American academy of pediatrics. (2010). *Declaración de política: Informe Clínico los piojos de la cabeza.*
Retrieved
desde <http://aappolicy.aappublications.org/cgi/content/full/pediatrics;126/2/392>

La Asociación Americana de Salud Escolar. (2005). *Las políticas escolares en el manejo de la pediculosis.* Retrieved desde:
<http://www.ashaweb.org/files/public/resolutions/pediculosis.pdf>

Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. (2010). Jefe *Los piojos información para las escuelas.* Retrieved desde
<http://www.cdc.gov/parasites/lice/head/index/html>